



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ต้องทำดังนี้

1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้ถึงกัน
แผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อรักษา
แผลสด
2. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ
10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกัน
ที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
(ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัข
ออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง
3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัข
มากเกินไป



“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือช่วน
ต้องล้างแผล ใส่ยา
กักหมา 10 วัน
และหาหมอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง



โรค
พิษสุนัขบ้า





โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต แต่พบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือ แมว

คนหรือสัตว์จะติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็น โรคนี้กัดหรือข่วน หรือน้ำลายสัมผัสกับบาดแผล เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุปาก เช่นถูกเลีย หรือน้ำลายกระเด็น โดย เชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่าเมื่อเชืโรค พิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลาย ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน แต่ บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมาก ไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรก คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มี อาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจาก แสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเกิน

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการทางตก ล้มมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลาย ไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัว ไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

กา
5 ย
กันสุนัขกัด



ย1 อย่าเหยย สุนัขให้โมโห



ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขตกใจ



ย3 อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า



ย4 อย่าหยิบ จานข้าว หรือเคลื่อนย้าย อาหาร ขณะสุนัข กำลังกินอาหาร



ย5 อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้ สุนัขที่ไม่รู้จักหรือ ไม่มีเจ้าของ